

## おたふくかぜ

# おたふくかぜ・水ぼうそうの予防接種費用の助成を始めました。

## ■おたふくかぜ・水ぼうそうの予防接種ができる医療機関

※接種を受ける際は、必ず事前に  
希望している医療機関にご確認ください。

	予防接種協力医療機関	電話番号	接種受付している曜日・時間	予約
杵 築 地 域	伊藤小児科医院	0978-62-6311	月～金) 9:00～11:30, 14:00～17:30 土) 9:00～11:30, 14:00～15:00	必要 2日前まで
	庄野医院	0978-63-5500	月～金) 9:00～11:30, 15:00～16:30 土) 9:00～11:30	必要
	菅原内科杵築	0978-63-5588	月・火・木・金) 9:00～12:30 14:00～18:00 水・土) 9:00～12:30	必要 3日前まで
	渡辺内科医院	0978-62-2104	診療時間と同じ	必要 3日前まで
	くりやまレディースクリニック	0978-66-1177	月・火・水・金) 9:00～12:30, 14:00～18:00 木) 9:00～12:30 土) 9:00～14:00	必要 2日前まで
	みやうちウイメンズクリニック	0978-66-4103	月・火・金・土) 14:00～17:00	必要 7日前まで
	杵築中央病院	0978-62-3080	月～金) 8:30～11:30, 14:00～17:00 土) 8:30～11:30	必要 2日前まで
山 香 地 域	杵築市立山香病院	0977-75-1234	月・水・木・金) 8:30～11:00, 15:00～16:00 火) 8:30～11:00	必要 2日前まで
	友岡医院	0977-76-2310	木) 8:30～12:00 14:00～16:00	必要 2日前まで
	サトウ医院	0977-75-0217	月～金) 9:00～12:00, 14:00～17:00 土) 9:00～12:00	必要 3日前まで
日 出 町	矢野小児科医院	0977-72-1011	月・火・水・金) 9:00～11:30 14:00～17:00 木) 9:00～11:30	電話にて 相談
	てしまこどもの杜クリニック	0977-28-0870	月～金) 9:00～11:30, 13:30～17:30 土) 9:00～12:30	必要
	酒井医院	0977-72-2624	診療時間と同じ	必要

### ◆持ち物

- ・助成を受けるための委任状
- ・母子手帳

※委任状は、健康推進館または市庁舎窓口にて配布しています。  
また、市役所ホームページからもダウンロードできます。  
※必ず保護者の方が記入・押印し、医療機関にお持ちください。

### ◆助成対象年齢

水ぼうそう・おたふくかぜともに杵築市に住民票がある1歳以上4歳未満の幼児です。

### ◆助成額

水ぼうそう・3,000円  
おたふくかぜ・2,000円

## MR(麻疹・風疹)ワクチンを接種していますか?

小学校就学1年前の方が、接種対象です。接種勧奨の個別通知をいたしました。  
できるだけ早めの接種をおすすめします。

【問い合わせ先】 杵築市健康推進館 (0978-64-2540)

杵築市が、元気な子どもの育つまちになるために、感染症の蔓延をどのように予防すべきか、シリーズで学びます。  
7回目は、おたふくかぜについて、友岡医院小児科の友岡操先生にお話を伺います。

おたふくかぜは流行性耳下腺炎あるいはムンブスと呼ばれています。  
耳下腺の腫れと発熱で発症するのでおたふくかぜといわれていますが、ムンブスウィルスの感染による全身性感染症です。

おたふくかぜとは  
どんな病気ですか?

どのような症状が現れるのでしょうか?

耳下腺の腫れのピークは1～6日間、後左右どちらかの耳下腺が腫れます。やがて反対側も腫れてきます。耳下腺の腫れは2～3週間の潜伏期の後、3日間で、7日すると腫れがひいてきます。

合併症はありますか?

全身性ウイルス感染症です。多くの合併症があります。発熱・嘔吐・頭痛は髄膜炎を疑う症状として要注意です。しかし髄膜炎は無症状でもおこしているという報告があります。

どのような治療をしたらいよですか?

ワクチン接種の効果と副作用を教えてください

ワクチン接種の抗体陽性率は90%ですが、予防効果は1回の接種では十分でないのです。WHOでは2回接種を推薦しています。副作用はワクチン接種後2～3週後の発熱、耳下腺の腫れ、まれに無菌性髄膜炎の報告があります。

杵築市での取り組みは?

おたふくかぜの予防接種は市より助成が行われることになりました。1歳以上4歳未満の子どもさんに対し2千円の助成がありますので、是非この制度を利用し、ワクチン接種されることをお勧めします。  
※助成金については次ページをご覧ください。

ワクチン接種後いつから登園・登校できますか?

耳下腺の腫れが発現後、5日間経過し全身状態が良好となるまでと決められています。

ワクチンはいつ頃受けられます。ウイルスの唾液中の排泄はしているといつても外で遊ばれたりはしないでください。難聴は後遺症としてもっと警戒すべきものの一つで、多くは片側性ですが、両側性になる場合もあります。思春期以降の成人が発症する時に精巣炎20～40%、卵巣炎5%をおこすことがあります。卵巣炎は稀といわれます。他に脳炎、脾炎、腎炎になります。

ワクチンはいつ頃受けられます。1歳から接種可能です。1歳でMRワクチン接種後、遅くとも集団生活開始までに接種することが望ましいです。1歳から接種可能ですが、1歳でMRワクチン接種後、遅くとも集団生活開始までに接種することが望ましいです。