

予防接種カレンダー

杵築市
令和6年4月

【 】定期接種の接種可能な時期

| ワクチン名(標準的接種時期) | 3か月 | 6か月 | 9か月 | 1歳 | 1歳6か月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 |
|--|--|-----|-----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| インフルエンザ菌b型(Hib) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【生後2か月～5歳未満】27日以上の間隔で3回、初回接種終了後、標準的には7～13か月の間に1回追加。※初回の3回は生後12か月までに完了してください | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小児用肺炎球菌 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【生後2か月～5歳未満】27日以上の間隔で3回、12～15か月で1回追加※初回の3回は生後12か月までに完了してください | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B型肝炎 H28.4.1生まれの方から対象 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【生後12か月未満まで】3回(標準的な接種期間:生後2～9か月) * 27日以上の間隔を置いて2回接種後、1回目から139日以上の間隔を置いて1回接種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四種混合(DPT-IPV) D(ジフテリア)・P(百日咳)・T(破傷風)・IPV(ポリオ) (1期初回:生後2か月～1歳/1期追加:初回接種終了後1年～1年6か月後/2期:11歳) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | |
| | 1期→【生後2か月～90か月未満】初回は沈降精製百日せきジフテリア破傷風ポリオ混合ワクチン(DPT-IPV)を標準的には20日以上の間隔で3回。追加はDPT-IPVを1回*初回接種後、6か月以上の間隔をおく(標準的には12～18か月の間隔を空ける) | | | | | | | | | | | | | | | 2期→【11歳、12歳】沈降ジフテリア破傷風トキソイド(DT)を1回 | | | | | |
| 五種混合(DPT-IPV-Hib) D(ジフテリア)・P(百日咳)・T(破傷風)・IPV(ポリオ)・Hib(インフルエンザ菌b型) (1期初回:生後2か月～7か月/1期追加:初回接種終了後1年～1年6か月後/2期:11歳) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | |
| | 1期→【生後2か月～90か月未満】初回は五種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)を標準的には20日以上の間隔で3回。追加はDPT-IPV-Hibを1回*初回接種後、6か月以上の間隔をおく(標準的には6か月～18か月の間隔を空ける) | | | | | | | | | | | | | | | 2期→【11歳、12歳】沈降ジフテリア破傷風トキソイド(DT)を1回 | | | | | |
| BCG (生後12か月未満) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【生後12か月未満まで】1回(標準的な接種期間:生後5～8か月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻しん・風しん(MR) *乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン *1歳になったらできるだけ早く接種しましょう! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1期→【生後12か月～24か月未満】1回 | | | | | | | | | | | | | | | 2期→【5歳以上7歳未満で小学校就学前1年間にある児=幼稚園の年長児】1回 | | | | | |
| 水痘(水ぼうそう) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【生後12か月～36か月未満】3か月以上(標準的には6か月～12か月まで)の間隔を置いて合計2回接種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本脳炎 1期:3歳/1期追加:4歳 2期:9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1期→【生後6か月～90か月未満】初回は6日以上の間隔で2回、追加は初回終了後おおむね1年後に1回 | | | | | | | | | | | | | | | 2期→【9歳～13歳未満】1回 | | | | | |
| 子宮頸がん(HPV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【小学6年生～高校1年の女兒】2～3回※ワクチンによって接種回数・間隔が異なります | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス(1価) 初回接種は14週6日までに開始 | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生後6週0日から生後24週0日までの間に、27日以上の間隔をあけて2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス(5価) 初回接種は14週6日までに開始 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生後6週0日から生後32週0日までの間に、27日以上の間隔をあけて3回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意接種 | 一部助成あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | おたふくかぜ (助成期間中1回のみ2000円助成) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【1歳以上4歳未満】助成あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ (中学3年まで年1回のみ1000円助成) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13歳未満は2～4週間隔で2回接種 | | | | | | | | | | | | | | | 13歳以上は1回接種(助成は中学3年生まで) | | | | | |

■ および【 】内は法律等で定められている期間(公費負担)、■は、接種が望ましい時期です。
 ↓ は接種時期の例を示しましたのでスケジュールづくりの参考にしてください。
 ■ は任意接種が可能な時期です。■ は任意接種の助成対象期間です。

どちらか1つ接種